

DOX ESTEVE

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Sustancia activa:

Doxiciclina (hclato) 100 mg

Excipientes c.s.p 1 g

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral para administrar en el agua de bebida.

DATOS CLÍNICOS

ESPECIES DE DESTINO

Bovinos (Terneros), Porcino (cerdos de cebo) y Aves (pollos de engorde)

INDICACIONES DE USO, ESPECIFICANDO LAS ESPECIES DE DESTINO

Bovinos (Terneros):

Tratamiento de infecciones respiratorias producidas por gérmenes sensibles a la doxiciclina (neumonías).

Porcino (cerdos de cebo):

Tratamiento de procesos infecciosos incluidos dentro del complejo respiratorio porcino, causados por gérmenes sensibles a la doxiciclina tales como *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella haemolitica*, *Bordetella bronchiseptica* y/o *Haemophilus parasuis*.

Aves (pollos de engorde):

Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por gérmenes sensibles a la doxiciclina en aves, tales como *Micoplasma spp* y/o *Pasteurella multocida* (Pasteurellosis, Micoplasmosis).

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con:

- Historial conocido de hipersensibilidad a las tetraciclinas.
- Alteraciones hepáticas graves.

ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO

No usar en animales productores de leche destinada al consumo humano.

No administrar a aves productoras de huevos para consumo humano.

REACCIONES ADVERSAS (FRECUENCIA Y GRAVEDAD)

Como para todas las tetraciclinas, pueden aparecer reacciones alérgicas de fotosensibilidad.

En tratamientos muy prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal.

USO DURANTE LA GESTACIÓN O LA LACTANCIA

En Bóvidos (Terneros) y Aves (pollos de engorde), no procede.

Porcino: No administrar a hembras gestantes o lactantes

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

La absorción de la doxiciclina puede disminuir en presencia de altas cantidades de calcio, hierro, magnesio o aluminio de la dieta. No administrar conjuntamente con antiácidos, caolín y preparaciones de hierro.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosis:

Bóvidos (Terneros) y Porcino (cerdos de cebo): 10 mg/kg p.v./día durante 4-5 días (equivalente a 1 g del medicamento por cada 10 kg p.v.)

Aves (pollos de engorde): 20 mg de doxiciclina/kg p.v./día durante 3-5 días (equivalente a 2 g del medicamento por cada 10 kg p.v.).

Modo De Administración

Bóvidos (Terneros): Vía oral, disuelto en la leche o preferentemente en el agua de bebida.

Porcino (cerdos de cebo) y Aves (pollos de engorde): Vía oral, disuelto en el agua de bebida.

TIEMPO(S) DE ESPERA

Bovinos (terneros):	Carne: 7 días
	Leche: No procede
Porcino (cerdos de cebo):	Carne: 5 días
Aves (pollos de engorde):	Carne: 9 días
Huevos:	No administrar a aves productoras de huevos para consumo humano

DATOS FARMACÉUTICOS

PERIODO DE VALIDEZ

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 24 meses
Período de validez después de abierto el envase primario con el medicamento: 1 mes

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsa de poliéster/aluminio/politeno de 1 kg.

NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

8.686