

Labhidro AD3E líquido

Premezcla vitamínica hidrosoluble. Uso veterinario




INDICACIONES

Deficiencias en vitaminas. En los periodos críticos de la vida de los animales: épocas de reproducción, gestación y lactación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral en el agua de bebida o reemplazante lácteo.

ESPECIES DE DESTINO



POSOLOGÍA

Durante 7 días como mínimo.

Aves:

0,05 ml/litro de agua de bebida.

Bóvidos:

Adultos:
0,05 ml/litro de agua de bebida por animal y día.

Terneros:

0,08 ml/litro de agua de bebida por animal y día.

Cerdos:

Adultos:

0,1 ml/litro de agua de bebida por animal y día.

Équidos:

Adultos:

0,2 ml/litro de agua de bebida por animal y día.

Potros:

0,1 ml/litro de agua de bebida por animal y día.

Óvidos y cápridos:

0,1 ml/litro de agua de bebida por animal y día.

Conejos:

0,05 ml/litro de agua de bebida por animal y día.

Labhidro AD₃E líquido

Premezcla vitamínica hidrosoluble. Uso veterinario



PRESENTACIÓN

Caja con 10 x 1 litro.
Caja con 4 x 5 litros.

TIEMPO DE ESPERA

No precisa.

COMPOSICIÓN POR L

• **Vitaminas, provitaminas y sustancias químicas bien definidas que poseen un efecto similar:**

Vitamina A (E-672)	100.000.000 UI
Vitamina D ₃ (E-671)	10.000.000 UI
Vitamina E (acetato de dl- α -tocoferol)	40 UI
Soporte de origen acuoso c.s.p. (agua)	1 L

MODO DE CONSERVACIÓN

Mantener protegido de la luz y a temperatura inferior a 25° C.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

α 0108100341 22.613-CAT